NOVO

Nesyrgy®

NEBIVOLOL / AMLODIPIN

SINERGIJA U AKCIJI![1,3]

NOVA MOGUĆNOST LIJEČENJA ZA VAŠE BOLESNIKE S HIPERTENZIJOM: "Nesyrgy®"

POJEDNOSTAVLJENO LIJEČENJE ZA BOLESNIKE S HIPERTENZIJOM [1,2]

KLJUČNE PREDNOSTI NESYRGY®-a:

- **Dvije molekule, jedna tableta:**
  Nesyrgy® pojednostavljuje liječenje kombiniranjem nebivolola i amlodipina u jednoj tableti.[1,2]
- **Poboljšano liječenje krvnog tlaka:**
  Nesyrgy® je poboljšao adherenciju bolesnika, a kombinacija komponenti ima dodatni antihipertenzivni učinak, snižavajući krvni tlak u većoj mjeri nego svaka komponenta zasebno.[1,2]
- **Dobra podnošljivost:**
  Podnošljivost **Nesyrgy®-a** je u skladu s dobro poznatim sigurnosnim profilom dviju monoterapija.[2]

BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Terapijske indikacije:

➥ Liječenje esencijalne hipertenzije kao zamjenska terapija u odraslih bolesnika u kojih je postignuta kontrola bolesti istodobnom primjenom nebivolola i amlodipina, u istim dozama kao u kombinaciji, ali u zasebnim tabletama.[2]

Doziranje i način primjene:

➥ Preporučena doza je jedna tableta dnevno kao pojedinačna doza, po mogućnosti u isto doba dana. Kombinacija fiksnih doza nije prikladna za inicijalnu terapiju. Ako je potrebno prilagođavanje doze, to se treba učiniti s pojedinačnim komponentama.[2]

Kontraindikacije:

➥ Preosjetljivost na djelatnu tvar, derivate dihidropiridina ili neku od pomoćnih tvari. Insuficijencija jetre ili oštećenje funkcije jetre. Akutno zatajenje srca, šok (uključujući kardiogeni šok), epizode dekompenzacije zatajenja srca (također nakon akutnog infarkta miokarda) koje zahtijevaju iv. inotropno liječenje, sindrom bolesnog sinusnoga čvora, uključujući sinoatrijski blok, srčani blok drugoga i trećeg stupnja (bez električnog stimulatora srca). Bronhospazam i bronhalna astma u anamnezi, neliječeni feokromocitom, metabolička acidoza, bradikardija (srčana frekvencija <60 otkucaja u minuti prije početka terapije), hipotenzija (sistolički krvni tlak <90 mmHg), teški poremećaji periferne cirkulacije, opstrukcija izlaznog trakta lijeve klijetke (npr. stenoza aorte visokog stupnja).[2]

Reference: 1. Desideri G i sur., Extemporaneous combination therapy with nebivolol/amlodipine for the treatment of hypertension: a real-world evidence study in Europe. Curr Med Res Opin. 2024; 40(5):733-743. 2. Nesyrgy, Sažetak opisa svojstava lijeka, lipanj, 2025.; 3. Geary N. Understanding synergy. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2013; 304: E237-E253.

Opis ispitivanja ref.1 (Desideri G i sur.,2024.)

Cilj: Istraživanje primjene kombinacije nebivolola i amlodipina u zasebnim tabletama (NA-EXC) u stvarnom svijetu kod odraslih bolesnika s dijagnozom hipertenzije u Europi. Metode: Retrospektivna analiza podataka izvučenih iz sedam baza podataka zdravstvenih kartona bolesnika i recepata iz Italije, Njemačke, Francuske, Mađarske i Poljske, kako bi se utvrdila prevalencija i incidencija primjene NA-EXC-a te procijenio broj bolesnika koji potencijalno ispunjavaju uvjete za kombinaciju dvaju antihipertenziva u jednoj tableti. Sekundarni ciljevi uključivali su: opis populacije korisnika NA-EXC-a i procjenu njihovog pridržavanja liječenju na temelju udjela pokrivenih dana. Rezultati: Utvrđeno je da je upotreba NA-EXC-a česta u Europi i kretala se između 2,9% i 9,9% svih bolesnika identificiranih u bazama podataka s receptom za nebivolol i/ili amlodipin. Procijenjeni broj bolesnika koji su potencijalno ispunjavali uvjete za kombinaciju nebivolola i amlodipina u jednoj tableti u Italiji i Njemačkoj bio je 178 133 odnosno 113 240. Korisnici NA-EXC-a bili su uglavnom u dobi od 70 do 79 godina, imali su metaboličke poremećaje i druge komorbiditete; >70%, njih je primalo ≥2 istodobna lijeka prije početka NA-EXC-a. Adherencija na NA-EXC definirana je kao visoka samo kod 15,6% do 35% bolesnika. Zaključci: Kombinacija nebivolola i amlodipina u zasebnim tabletama često se propisuje u Europi, međutim adherencija je slaba. Razvoj kombinacije nebivolola i amlodipina u jednoj tableti može poboljšati adherenciju smanjenjem broja tableta koje se daju bolesnicima i time pojednostavljenjem režima liječenja.

Posljednji odobreni Sažetak opisa svojstava lijeka se nalazi na štandu izložbenog prostora. Broj(evi) odobrenja za stavljanje lijeka u promet: Nesyrgy® 5 mg/5 mg filmom obložene tablete: HR-H-594203980; Nesyrgy® 5 mg/10 mg filmom obložene tablete: HR-H-886980947. Za više informacija o lijeku, doziranju, načinu primjene, kontraindikacijama, mjerama opreza i nuspojavama, prije propisivanja proučiti posljednji odobreni Sažetak opisa svojstava lijeka i Uputu o lijeku dostupne na www.halmed.hr. Lijek se izdaje na recept. Ako želite prijaviti nuspojavu na Berlin-Chemie Menarini lijek, molimo Vas, pošaljite nam email na adresu: hr.pv@berlin-chemie.com. SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE.

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.; Horvatova 80/A; 10020 Zagreb; Tel.:(01) 48-21-360; www.berlin-chemie.hr
Datum pripreme: 05.02.2026. HR-NES-1-2026_v01_print